

اطلاعیه سازمان غذا و دارو و هشدار در خصوص عدم مصرف سموم آفت کش کشاورزی جهت درمان شپش سر

بر اساس گزارشات دریافتی از همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، متأسفانه چند مورد مسمومیت حاد و حتی مرگ ناشی از استفاده موضعی سموم آفت کش کشاورزی (دiazinon از دسته سموم ارگانوفسفره) به منظور درمان شپش سر کودکان مشاهده شده است.

در همین راستا، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو، هشدار می دهد در صورت برخورد با افراد مبتلا به شپش، **خصوصاً کودکان** که این آلودگی در ایشان شایع تر است، ضمن مراجعه به پزشک و داروساز و تهیه شامپوها و لوسیون های مخصوص درمان شپش موجود در داروخانه ها و استفاده بر اساس توصیه های اعلام شده، **به هیچ عنوان از سموم دفع آفات و حشرات مانند سموم کشاورزی و یا سموم خانگی، برای دفع شپش استفاده نکنید.** سموم دفع آفات نباتی مورد استفاده در کشاورزی، دارای سمیت بالایی می باشند و شدیداً از طریق پوست قابل جذب هستند و تماس پوستی با این سموم می تواند منجر به مسمومیت و مرگ شود. به طوری که حتی از کشاورزان درخواست می شود ضمن انجام سم پاشی مزارع، از دستکش لاستیکی، کفش لاستیکی جلو بسته و ماسک حفاظت کننده استفاده نمایند تا از بروز مسمومیت ناشی از تنفس و یا تماس سم با پوست پیشگیری شود.

ضمن ابراز تأسف از بروز این حادثه غم انگیز، از عموم مردم خصوصاً ساکنین مناطق روستایی و کشاورزی که به سموم دفع آفات دسترسی دارند، درخواست می شود توصیه های پیشگیرانه را جدی بگیرند و برای درمان شپش و موارد مشابه، فقط به پزشک و داروساز مراجعه نمایند و به هیچ عنوان از سموم دفع آفات و سموم خانگی جهت درمان شپش استفاده نشود.

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

سازمان غذا و دارو

تأبستان ۱۴۰۱